

Université de Cergy-Pontoise  
Département de Mathématiques  
L1 MIPI - S1  
2018/2019



# Cours de Mathématiques : Fonctions d'une variable réelle

-

## Polycopié d'Exercices



# Chapitre 1 : Logique et nombres réels

**Exercice 1.** Montrer les identités suivantes ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) :

a)  $S_1 = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ . Pour cela on pourra calculer  $2S_1$ , en écrivant les éléments une fois dans le sens croissant, une fois dans le sens décroissant.

b)  $S_2 = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ . Pour cela on pourra calculer de deux façons différentes la somme :

$$\sum_{k=0}^n \left( (k+1)^3 - k^3 \right).$$

c) Retrouver les résultats des questions a) et b) à l'aide d'un raisonnement par récurrence.

**Exercice 2.** Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , montrer que  $\prod_{k=1}^n \left( 1 + \frac{1}{k} \right)^k = \frac{(n+1)^n}{n!}$ .

*Rappel :* si  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$  et par convention  $0! = 1$ .

**Exercice 3.** Démontrer que pour tous nombres réels  $a$  et  $b$  et pour tout entier naturel  $n$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k.$$

En déduire que pour tout réel  $q \neq 1$ ,  $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ .

**Exercice 4.** On rappelle que si  $k$  et  $n$  sont des entiers, avec  $0 \leq k \leq n$ ,  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ .

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et pour tout  $k \in \{0, \dots, n-1\}$

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}.$$

**Exercice 5.** En utilisant des tables de vérité, montrer que

a)  $(\text{non } (A \text{ ou } B)) \Leftrightarrow (\text{non } A \text{ et non } B)$ ,

b)  $(\text{non } (A \text{ et } B)) \Leftrightarrow (\text{non } A \text{ ou non } B)$ ,

c)  $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow ((A \Rightarrow B) \text{ et } (B \Rightarrow A))$ ,

d)  $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\text{non } A \text{ ou } B)$ .

e)  $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\text{non } B \Rightarrow \text{non } A)$ .

**Exercice 6.** Écrire la négation de  $a \leq b \leq c$  et celle de  $a = b = c$ .

**Exercice 7.** Dans chacun des cas suivants, la proposition  $B$  est-elle une condition suffisante (CS), une condition nécessaire (CN) ou une condition nécessaire et suffisante (CNS) de la proposition  $A$ ?

- a)  $A : "x^2 \geq x"$  et  $B : "x \geq 1"$
- b)  $A : "n \text{ impair}"$  et  $B : "n^2 \text{ impair}"$
- c)  $A : "x^2 < 0"$  et  $B : "x \geq 10^{10}"$
- d)  $A : "x \in [1, 3]"$  et  $B : "x \in [1, 4]"$

**Exercice 8.** Soient  $x, y \in \mathbb{R}$  tels que  $1 \leq x < 3$  et  $-1 < y \leq 2$ . Donner des encadrements de  $x + y, x - y, xy, \frac{1}{x}, \frac{1}{y}$  et  $\frac{x}{y}$ .

Même questions en supposant cette fois que  $-3 \leq x \leq 2$  et  $-5 \leq y \leq 1$ .

**Exercice 9.** Montrer les inégalités suivantes, pour tous  $x, y$  réels :

- a) Si  $x > 0$  alors  $x + \frac{1}{x} \geq 2$ ,
- b)  $xy \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2$ ,
- c)  $xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$ ,

**Exercice 10.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- a)  $3x^2 + 4x + 3 = 4x^2 - 3x + 4$ .
- b)  $\frac{3x+4}{4x+2} = x$ .
- c)  $x = \sqrt{3x+10}$ .
- d)  $\frac{2x+1}{3x-4} = \frac{x+1}{x-1}$ .

**Exercice 11.** Soient  $a_1, \dots, a_n$  des nombres réels positifs. Montrer que si  $\sum_{k=1}^n a_k = 0$  alors tous les  $a_k$  sont nuls.

**Exercice 12.** On considère un nombre réel  $x \geq 0$  et les deux propositions  $A : "Pour tout réel  $\varepsilon$  strictement positif,  $0 \leq x \leq \varepsilon"$  et  $B : "x = 0"$ . Montrer que  $A \Rightarrow B$ .$

**Exercice 13.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes et représenter graphiquement l'ensemble des solutions :

- a)  $2x^2 - 3x + 4 < 4x^2 + 2x + 9$ ,
- b)  $2x^3 - 5x^2 + 3x \leq 0$ ,
- c)  $\frac{2x+1}{3x+2} < 0$ ,
- d)  $\frac{x-1}{x+2} \geq 3$ ,
- e)  $\frac{1}{x} > x$ ,
- f)  $|x+1| < 0.1$ ,
- g)  $|x-2| > 10$ ,
- h)  $|x| < |x+1|$ ,

**Exercice 14.** Soient  $x, y$  deux nombres réels. On note  $\max(x, y)$  le plus grand des deux nombres  $x$  et  $y$ , et  $\min(x, y)$  le plus petit.

- a) Montrer que  $x + y = \max(x, y) + \min(x, y)$ .
- b) Montrer que  $|x - y| = \max(x, y) - \min(x, y)$ .
- c) Montrer que  $\max(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|)$  et que  $\min(x, y) = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|)$ .

**Exercice 15.** On suppose que  $x \in \mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}^*$  vérifient  $|x - a| < |a|$ . Montrer qu'alors  $x$  est non nul et de même signe que  $a$ .

**Exercice 16.** Soit  $x \geq 0$ . Montrer que  $\frac{2x+5}{x+2}$  est plus près de  $\sqrt{5}$  que  $x$  ne l'est.

### Exercice 17.

- a) Montrer que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est un irrationnel.
- b) Montrer, en donnant des exemples, que la somme de deux nombres irrationnels peut être rationnelle ou irrationnelle.

**Exercice 18.** Soient  $x, y \in \mathbb{R}$ .  $E(x)$  désigne la partie entière de  $x$ .

- a) Montrer que  $E(x) + E(y) \leq E(x + y) \leq E(x) + E(y) + 1$ .
- b) Montrer que  $E\left(\frac{x}{2}\right) + E\left(\frac{x+1}{2}\right) = E(x)$ .

**Exercice 19.** Soient  $f_1, f_2$  et  $f_3$  des fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Pour chacune des propriétés suivantes, écrire sa négation et illustrer graphiquement la propriété et sa négation.

- a)  $\forall i \in \{1, 2, 3\}, \exists a \in \mathbb{R}, f_i(a) = 1$ .
- b)  $\exists a \in \mathbb{R}, \forall i \in \{1, 2, 3\}, f_i(a) = 1$ .
- c)  $\exists i \in \{1, 2, 3\}, \forall a \in \mathbb{R}, f_i(a) = 1$ .
- d)  $\forall a \in \mathbb{R}, \exists i \in \{1, 2, 3\}, f_i(a) = 1$ .

**Exercice 20.** Ecrire la négation des phrases suivantes :

- a)  $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 < n + 1$ .
- b)  $\forall a \in A, \exists b \in B, a < b^2$  et  $a \leq b^3 + 1$ .
- c)  $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, |x - 1| < \alpha \implies |x^2 - 1| < \varepsilon$ .

**Exercice 21.** Pour chacune des phrases suivantes dire si elle est vraie ou fausse. Justifier.

- a)  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < xy$ .
- b)  $\forall x \in \mathbb{R}, x > 1$  ou  $x^2 < 2$ .
- c)  $\forall x \in \mathbb{R}, x > 1 \implies x \geq 0$ .
- d)  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, (xt + y = 0 \implies x = y = 0)$
- e)  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (\forall t \in \mathbb{R}, xt + y = 0) \implies x = y = 0$

**Exercice 22.** Pour  $a, b \in \mathbb{R}$  on pose  $P(a, b)$  la proposition  $a + b^2 = 0$ .

- a) La proposition  $P(1, 1)$  est-elle vraie ? Et la proposition  $P(-1, 1)$  ?
- b) La proposition " $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, P(a, b)$ " est-elle vraie ?
- c) La proposition " $\forall a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, P(a, b)$ " est-elle vraie ?
- d) La proposition " $\exists a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, P(a, b)$ " est-elle vraie ?
- e) La proposition " $\exists a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, P(a, b)$ " est-elle vraie ?

## Chapitre 2 : Applications

**Exercice 1.** On considère trois ensembles  $A, B, C$ . Montrer que

- a)  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ .
- b)  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ .
- c)  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ .
- d)  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .
- e)  $(A \cup B \subset A \cup C \text{ et } A \cap B \subset A \cap C) \implies (B \subset C)$ .

**Exercice 2.** Soient  $A, B \subset E$ ,  $C, D \subset F$ , et  $f$  une application de  $E$  dans  $F$ . Montrer que

a)  $(A \subset B) \Rightarrow (f(A) \subset f(B))$ .

b)  $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ .





c)  $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ . A l'aide d'un exemple montrer que l'inclusion peut être stricte.

d)  $(C \subset D) \Rightarrow (f^{-1}(C) \subset f^{-1}(D))$ .

e)  $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$ .

f)  $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$ .

**Exercice 3.** Dans chacun des cas suivants représenter l'image directe  $f_i(A)$  de  $A$  par  $f_i$ .



**Exercice 4.**

a) Déterminer une bijection de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}^*$ .

b) Déterminer une bijection de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{Z}$ .


**Exercice 5.** Montrer que l'application  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , définie par  $f(x) = 2x + 5$ , est bijective et déterminer  $f^{-1}$ .

**Exercice 6.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = |x - 3| + 4$ .

a) Déterminer l'image par  $f$  des sous-ensembles suivants :  $[5, 7]$ ,  $[2, 4[$  et  $[-1, 2] \cup [5, 7]$ .

- b) Déterminer l'image réciproque par  $f$  des sous-ensembles suivants :  $[3, 6]$ ,  $[5, 7]$  et  $[0, 2]$ .
- c) L'application  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  est-elle injective? surjective?
- d) Trouver un sous-ensemble  $A$  de  $\mathbb{R}$  tel que  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  soit injective.
- e) Trouver un sous-ensemble  $A$  de  $\mathbb{R}$  tel que  $f : A \rightarrow [4, 5]$  soit injective.
- f) Trouver un sous-ensemble  $B$  de  $\mathbb{R}$  tel que  $f : \mathbb{R} \rightarrow B$  soit surjective.
- g) Trouver des sous-ensembles  $A$  et  $B$  de  $\mathbb{R}$  tels que  $f : A \rightarrow B$  soit bijective.

**Exercice 7.** Dans chaque cas représenter l'image réciproque  $f_i^{-1}(A)$  de  $A$  par  $f_i$ .



**Exercice 8.** Soient  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$ . Montrer que

1. si  $f$  et  $g$  sont injectives, alors  $g \circ f$  est injective,
2. si  $f$  et  $g$  sont surjectives, alors  $g \circ f$  est surjective,
3. si  $f$  et  $g$  sont bijectives, alors  $g \circ f$  est bijective et  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ ,
4. si  $g \circ f$  est injective, alors  $f$  est injective,
5. si  $g \circ f$  est surjective, alors  $g$  est surjective.

**Exercice 9.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Écrire à l'aide de symboles logiques les propositions suivantes :

- a) La fonction  $f$  est nulle.

- b) La fonction  $f$  s'annule.
- c) La fonction  $f$  n'est pas constante.
- d) 2 n'est pas l'image d'un réel par  $f$ .
- e)  $f$  prend toujours la même valeur pour des nombres opposés.
- f) Aucun réel positif n'est égal à son image.

**Exercice 10.** Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. Pour chacune des assertions suivantes exprimer “en français” ce qu'elle signifie et écrire sa négation. Par exemple “ $\forall x \in I, -x \in I$  et  $f(-x) = f(x)$ ” signifie “ $f$  est paire” et sa négation est “ $\exists x \in I, -x \notin I$  ou  $f(-x) \neq f(x)$ ”.

- a)  $\forall x \in I, f(x) \neq 0$ .
- b)  $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in I, f(x) = y$ .
- c)  $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, |f(x)| \leq M$ .
- d)  $\forall (x, y) \in I^2, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ .
- e)  $\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ .

**Exercice 11.** Les fonctions valeur absolue et partie entière sont-elles majorées ? minorées ? bornées ? paires ? impaires ? croissantes ? décroissantes ? Dessiner leur graphe.

**Exercice 12.** Montrer que la fonction  $\frac{\sin(x)}{4} + \cos(10x)$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ . Même question pour la fonction  $\frac{\cos(x) + 4 \sin(x)}{1 + e^x}$ .

**Exercice 13.** Soient  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $M \in \mathbb{R}_+$ . On dit que  $f$  est *lipschitzienne* de rapport  $M$  si et seulement si elle vérifie :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

- a) Montrer que la fonction  $g$  définie par  $g(x) = 3x + 4$  est lipschitzienne de rapport à préciser.
- b) Soit  $f$  une fonction lipschitzienne de rapport  $M$ . Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq M|x| + |f(0)|.$$

En déduire que la fonction  $\frac{f(x)}{\sqrt{x^2 + 1}}$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ .

## Chapitre 3 : Limites des fonctions d'une variable réelle

**Exercice 1.** Montrer à l'aide de la définition que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2.$$



**Exercice 2.** Calculer les limites suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 \text{a)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 5x - 7}{3x^3 - 2x^2 + 5} & \text{d)} \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln(x^4) & \text{g)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \\
 \text{b)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 + x^3 + x + 1}{2x^3 + x - 4} & \text{e)} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x^3 + \ln(x) & \text{h)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} - e^x}{x^2 + 1} \\
 \text{c)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + 3x^2 + x}{2x^3 + x^2 + 3x} & \text{f)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x + 1} & \text{i)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} + \ln(x)
 \end{array}$$

**Exercice 3.** Calculer les limites suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 \text{a)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^3}{1 - x^7} & \text{e)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x + 3x^2} & \text{i)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\ln(1 + x)} \\
 \text{b)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x - 1} - \frac{3}{x^3 - 1} & \text{f)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^4(x)}{x^3 \ln(1 + x)} & \text{j)} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \\
 \text{c)} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x - 1} - 1}{x^2 - 4} & \text{g)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - e^x) \sin x}{x^2 + x^3} & \text{k)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2x + x^2)}{x} \\
 \text{d)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 2x + 3} - x & \text{h)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{2x} & \text{l)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{2x} + x^2)}{x}
 \end{array}$$

**Exercice 4.** Calculer, si elles existent, les limites suivantes :

- Limite éventuelle en 0 de  $x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ .
- Limite éventuelle en 0 de  $x E\left(\frac{1}{x}\right)$  où  $E$  désigne la fonction partie entière.
- Limite éventuelle en 0 de  $(1 + x)^{\frac{1}{x}}$ .

**Exercice 5.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

- Ecrire à l'aide de symboles logiques "la fonction  $f$  n'admet pas de limite finie en  $+\infty$ ".
- Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \sin(x)$ . Montrer que pour tout  $A \in \mathbb{R}$ ,  $f([A, +\infty[) = [-1, 1]$ .
- En déduire que la fonction sinus n'admet pas de limite en  $+\infty$ .

**Exercice 6.**

- Montrer que pour tout  $a \in \mathbb{R}_+^*$  et pour tout couple de réels  $(x, y)$  appartenant à  $[a, +\infty[$ , on a

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| \leq \frac{1}{a^2} |x - y|.$$

- En déduire que pour tout  $x_0 \in \mathbb{R}_+^*$  et pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe  $\alpha > 0$  tel que :

$$|x - x_0| < \alpha \Rightarrow \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right| < \varepsilon.$$

- Écrire une formulation de la propriété précédente en termes de limite.

**Exercice 7.** Soient  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$ , et  $a, l \in \mathbb{R}$ .

- Montrer que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |l|$ .
- Montrer que  $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ .

3. Donner un exemple de  $f$  pour laquelle  $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = l$ , et  $f$  ne possède pas de limite en  $a$ .

**Exercice 8.** Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  telle que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ , montrer qu'il existe  $a \in \mathbb{R}$  tel que  $0 \notin f([a, +\infty[)$ .

## Chapitre 4 : Continuité

**Exercice 1.** Etudier la continuité des fonctions  $f_i$  définies par les formules :

- a)  $f_1(x) = \cos(1 + x^2)$ .  
b)  $f_2(x) = \ln(1 + x^2)$ .  
c)  $f_3(x) = \sqrt{1 - x^2}$ .  
d)  $f_4(x) = \sqrt{\ln x}$ .

**Exercice 2.**

- a) Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par  $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x} - 1}{x} & \text{si } x < 0, \\ \frac{x^2 + 2x + 3}{x^3 + 1} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$

La fonction  $f$  est-elle continue en 0 ?

- b) Soit  $g : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par  $g(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x)}{x-1} & \text{si } 0 < x < 1, \\ 2 & \text{si } x = 1, \\ \frac{x+1}{3x-1} & \text{si } x > 1. \end{cases}$

La fonction  $g$  est-elle continue en 1 ?

**Exercice 3.** Pour quelle(s) valeur(s) du réel  $a$  la fonction  $f$  définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} & \text{si } x < 0, \\ \frac{\ln(1+3x)}{2x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

est-elle prolongeable par continuité en 0 ? On précisera alors la valeur du prolongement de  $f$  en 0.

**Exercice 4.** Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$ .

- a) Sur quel ensemble  $D$  l'expression  $\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$  est-elle bien définie ?

On considère  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ .

b) Montrer que  $f$  est prolongeable par continuité en 0.

c) Montrer que la fonction ainsi prolongée est continue sur  $[-1; 1]$ .

**Exercice 5.** Soient  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continues, et soit  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $h(x) = \max(f(x), g(x))$ . Montrer que  $h$  est continue. Indication : on pourra utiliser l'Exercice 14 du Chapitre 1.

**Exercice 6.** Soit  $E : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction partie entière.

- a) En quels points de  $\mathbb{R}$  la fonction  $E$  est-elle continue ?
- b) En quels points de  $\mathbb{R}$  la fonction  $E$  est-continue à droite ?
- c) Pour chacun des intervalles  $I$  suivants la fonction  $E$  est-elle continue sur  $I$  ?

$$I = [0, 1], \quad I = ]0, 1[, \quad I = [0, 1[, \quad I = ]0, 1].$$

- d) Pour chacun des intervalles  $I$  de la question précédente la fonction  $E|_I$  est-elle continue ?

**Exercice 7.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $|f(x)| \leq |x|$ .

- a) Interpréter graphiquement cette condition.
- b) Montrer que  $f$  est continue en 0.

**Exercice 8.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continue vérifiant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x + y) = f(x) + f(y).$$

- a) Soit  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Montrer que si  $g(x) = 0$  pour tout  $x \in \mathbb{Q}$  alors  $g$  est nulle. Indication : on rappelle que l'ensemble  $\mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .
- b) Montrer que  $f(0) = 0$ .
- c) On pose  $\alpha = f(1)$ .
  - i) Montrer que  $f(x) = \alpha x$  pour tout  $x \in \mathbb{Q}$  (on pourra commencer par montrer le résultat pour  $x \in \mathbb{N}$  puis  $x \in \mathbb{Z}$ ).
  - ii) Montrer que  $f(x) = \alpha x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

**Exercice 9.**

- a) Montrer que l'équation  $x^{17} = x^{11} + 1$  admet au moins une solution dans  $\mathbb{R}^+$ .
- b) Montrer que tout polynôme  $P$  réel de degré impair admet au moins une racine réelle.

**Exercice 10.** Soit  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  continue telle que  $f([0, 1]) \subset [0, 1]$ , i.e. pour tout  $x \in [0, 1]$  on a  $f(x) \in [0, 1]$ . Montrer qu'il existe  $c \in [0, 1]$  tel que  $f(c) = c$ .

**Exercice 11.** Soient  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue et  $p$  et  $q$  deux réels strictement positifs. Montrer qu'il existe  $x_0 \in [0, 1]$  tel que

$$pf(0) + qf(1) = (p + q)f(x_0).$$

**Exercice 12.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . On considère les propriétés suivantes

$$P1 : \forall x \in \mathbb{R}, (f(x) > 0 \text{ ou } f(x) < 0) \quad \text{et} \quad P2 : (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) < 0).$$

- a) Les propriétés  $P1$  et  $P2$  sont-elles équivalentes ?
- b) Donner une CS simple sur la fonction  $f$  pour que  $P1$  et  $P2$  soient équivalentes.

**Exercice 13.**

- a) Donner un exemple d'une fonction  $f$  sur  $[0, 1]$ , non constante, telle que pour tout  $x \in [0, 1]$  on ait  $(f(x))^2 = 1$ .
- b) Soit  $f$  continue sur  $[0, 1]$  telle que pour tout  $x \in [0, 1]$  on ait  $(f(x))^2 = 1$ . Montrer que  $f$  est constante.

c) Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions continues telles que pour tout  $x \in I$  on ait  $(f(x))^2 = (g(x))^2 \neq 0$ . Montrer que  $f = g$  ou  $f = -g$ .

**Exercice 14.** Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $a \leq b$ . Pour chacune des affirmations suivantes dire si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse.

a) Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est continue alors  $f$  prend une fois et une seule fois toute valeur comprise entre  $f(a)$  et  $f(b)$ .

b) Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est continue alors  $f$  prend au moins une fois toute valeur comprise entre  $f(a)$  et  $f(b)$ .

c) Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est strictement monotone alors  $f$  prend une fois et une seule fois toute valeur comprise entre  $f(a)$  et  $f(b)$ .

d) Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et bornée alors  $f$  admet un maximum et un minimum.

e) Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et bornée alors  $f$  admet un maximum ou un minimum.

f) Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et ne s'annule pas alors  $\frac{1}{f}$  est bornée.

g) L'image du segment  $[a, b]$  par une fonction continue est un segment  $[c, d]$ .

h) L'image de l'intervalle  $]a, b[$  par une fonction continue est un intervalle  $]c, d[$ .

i) Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Si l'image de  $[a, b]$  par  $f$  est un segment alors  $f$  est continue.

j) Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Si l'image de  $[a, b]$  par  $f$  n'est pas un segment alors  $f$  n'est pas continue.

k) Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et croissante alors  $f$  est injective.

l) Si  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est telle que  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  alors il existe  $M \in \mathbb{R}$  tel que  $f$  soit décroissante sur  $[M, +\infty[$ .

**Exercice 15.** Donner un exemple de fonction  $f$  continue et définie sur  $]0, 1]$  telle que

a)  $f$  ne soit pas majorée.

b)  $f$  ne soit pas minorée.

c)  $f$  soit majorée mais n'a pas de maximum.

d)  $f$  soit minorée mais n'a pas de minimum.

**Exercice 16.** Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions continues de  $[0, 1]$  dans  $[0, 1]$  telles que  $f \circ g = g \circ f$ . On veut montrer qu'il existe un point  $c$  dans  $[0, 1]$  tel que  $f(c) = g(c)$ . On raisonne par l'absurde. On suppose que le résultat est faux.

a) Montrer qu'il existe  $\alpha > 0$  tel que

$$\underbrace{(\forall x \in [0, 1], f(x) - g(x) > \alpha)}_{(1)} \quad \text{ou} \quad \underbrace{(\forall x \in [0, 1], g(x) - f(x) > \alpha)}_{(2)}.$$

On note  $f_n = f \circ f \circ \dots \circ f$  ( $n$  fois) et  $g_n = g \circ g \circ \dots \circ g$ .

b) Montrer que les fonctions  $f_n$  et  $g_n$  sont continues sur  $[0, 1]$ .

c) Dans le cas (1), montrer que " $\forall n > 0, \forall x \in [0, 1], f_n(x) - g_n(x) > n\alpha$ ". En déduire que (1) ne peut pas arriver.

d) Montrer de la même manière que (2) ne peut pas arriver. Conclure.

**Exercice 17.** Soient  $I$  un intervalle et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . La fonction  $f$  est dite *uniformément continue sur  $I$*  si elle vérifie la propriété (P) suivante :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

- a) Quelle est la différence entre cette définition et celle de “ $f$  est continue sur  $I$ ” ?  
 b) Donner la négation de  $(P)$ .  
 c) Montrer que la fonction définie par  $f(x) = x^2$  n'est pas uniformément continue sur  $\mathbb{R}$  (on pourra choisir dans la négation de  $(P)$  :  $\varepsilon = 1$ ,  $x = \frac{1}{n}$  et  $y = x + \frac{\eta}{2}$ ).  
 d) Montrer que la fonction  $f(x) = x^2$  est uniformément continue sur  $[0, 1]$ .  
 e) On rappelle (voir l'Exercice 13 du Chapitre 2) que  $f$  est dite lipschitzienne si

$$\exists M \geq 0, \forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

Montrer que si  $f$  est lipschitzienne alors elle est uniformément continue.

## Chapitre 5 : Dérivabilité

**Exercice 1.** En utilisant la définition, calculer la dérivée des fonctions suivantes.

- a)  $f(x) = ax + b$  en tout  $x_0 \in \mathbb{R}$ .  
 b)  $f(x) = \sqrt{x}$  en tout  $x_0 > 0$ .  $f$  est-elle dérivable en 0 ?

**Exercice 2.** On rappelle que  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$ .

- a) En utilisant la définition, montrer que les fonctions  $\sin$  et  $\cos$  sont dérivables sur  $\mathbb{R}$  et calculer leur dérivée.  
 b) Montrer que la fonction  $\tan$  est dérivable sur son ensemble de définition et calculer sa dérivée.

**Exercice 3.** Calculer les dérivées des fonctions suivantes

- |                              |                            |   |
|------------------------------|----------------------------|---|
| a) $x^3 e^x$                 | e) $\frac{1}{1 + \tan(x)}$ | i) $\exp(\exp(x))$                          |
| b) $\frac{\sin(x)}{1 + x^2}$ | f) $\sin(x^5 + 2x)$        | j) $2^x$                                    |
| c) $\cos(3x - 1)$            | g) $\sin(\cos(x))$         | k) $a^x, a \in \mathbb{R}$                  |
| d) $\ln(1 + x^2)$            | h) $\ln(\ln(\ln(x)))$      | l) $\sin\left(\frac{x^2}{\cos(x^2)}\right)$ |

**Exercice 4.** Calculer  $f'$  en fonction de  $g'$  dans les cas suivants

- a)  $f(x) = g(x^2 + 3x)$ .  
 b)  $f(x) = g(x + g(x))$ .

**Exercice 5.** Étudier et calculer si elle existe la dérivée en 0 des fonctions  $f$  et  $g$  définies par

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

**Exercice 6.** Soient  $g$  et  $h$  deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$ , dérivables en 0 et telles que  $g(0) = h(0)$ . On définit la fonction  $f$  par

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x < 0, \\ h(x) & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Donner une condition nécessaire et suffisante sur  $g$  et  $h$  pour que  $f$  soit dérivable en 0 (On pourra essayer de deviner la solution en raisonnant graphiquement).

**Exercice 7.** La fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par la formule  $f(x) = (2x^2 + 3x)e^{-x}$  possède-t-elle un maximum ? Un minimum ? Si oui les déterminer.

**Exercice 8.** Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses (justifier).

- a) Toute fonction dérivable en  $x_0$  est continue en  $x_0$ . La réciproque ?
- b) Si  $f$  est dérivable à gauche et à droite en  $x_0$  alors  $f$  est dérivable en  $x_0$ .
- c) Si  $f$  est dérivable sur  $]0, 2[$  et  $f'(1) = 0$  alors  $f$  admet un extremum local en 1.
- d) La dérivée de  $f(x) = \cos(2x)$  est  $f'(x) = -\sin(2x)$ .
- e) On peut appliquer le théorème de Rolle à  $f(x) = |x|$  sur  $[-1, 1]$ . Même question avec  $g(x) = 5x^2 + 3$  sur  $[0, 2]$ .

**Exercice 9.** En utilisant des théorèmes du cours, montrer que

- a)  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}$ .
- b)  $\forall a, b \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{N}^*, (n+1)a^n < \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b-a} < (n+1)b^n$ .
- c) Si  $a_0, \dots, a_n$  vérifient  $a_0 + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$  alors  $\exists x \in ]0, 1[$  tel que  $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ .  
Indication : considérer la fonction  $f$  définie par  $f(x) = a_0x + a_1\frac{x^2}{2} + \dots + a_n\frac{x^{n+1}}{n+1}$ .

**Exercice 10.** Soit  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  avec  $f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = -1$ . Montrer que

- a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -1$ .
- b)  $\exists x_1 \in ]0, 1[, f(x_1) < 0$ .
- c)  $\exists x_2 \in ]0, 1[, f(x_2) = 0$ .
- d)  $\exists x_3 \in ]0, 1[, f'(x_3) = 0$ .

**Exercice 11.** Soit  $f$  continue sur  $[0, +\infty[$ , dérivable sur  $]0, +\infty[$  et telle que  $f(0) = 0$  et  $f'$  soit croissante.

- a) Montrer que  $\forall x > 0, f(x) \leq xf'(x)$ .
- b) Soit  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ . Montrer que  $g$  est croissante.

**Exercice 12.**

- a) Montrer que l'on a  $\forall x \in ]0, \pi[, x \cos(x) - \sin(x) < 0$ .
- b) Étudier le sens de variation de la fonction  $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$  sur l'intervalle  $]0, \pi[$ .
- c) Soient  $a$  et  $b$  des nombres réels tels que  $0 < a < b < \pi$ . Montrer que l'on a  $\frac{a}{b} < \frac{\sin(a)}{\sin(b)}$ .

**Exercice 13.** Soit  $p$  un entier positif.

- a) Montrer que la fonction  $f : [0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \frac{(1+x)^p}{1+x^p}$  a pour maximum  $2^{p-1}$ .
- b) Soient  $a$  et  $b$  des nombres réels positifs. Montrer que  $(a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$ .

**Exercice 14.** Soit  $f$  une fonction dérivable sur  $]a, b[$  avec  $0 < a < b$ . On suppose de plus que  $f$  est continue sur  $[a, b]$  et que  $f(a) = f(b) = 0$ . Montrer qu'il existe une tangente à la courbe représentative de  $f$  qui passe par l'origine. Indication : on pourra introduire la fonction  $g$  définie sur  $[a, b]$  par  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ .

**Exercice 15.** Soit  $f$  une fonction polynômiale réelle, ayant  $n$  racines réelles distinctes. Montrer que  $f'$  en a au moins  $n - 1$ .

**Exercice 16.** Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  telle que

$$\exists C > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^2.$$

Montrer que, pour tout  $x_0 \in \mathbb{R}$ ,  $f$  est dérivable en  $x_0$  et que  $f'(x_0) = 0$ . Que peut-on en déduire sur  $f$  ?

**Exercice 17.** Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 0$  si  $x \leq 0$ , et  $f(x) = \exp\left(-\frac{1}{x}\right)$  si  $x > 0$ .

a) Montrer que  $f$  est dérivable sur  $] -\infty, 0[$  et sur  $]0, +\infty[$ , et calculer  $f'$  sur chacun de ces intervalles.

b) Vérifier que  $f$  est continue en 0.

c) Montrer que  $f$  est dérivable en 0. Que vaut  $f'(0)$  ?

d) Montrer que  $f'$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

## Chapitre 6 : Fonctions réciproques

**Exercice 1.**

a) Démontrer que la fonction réciproque d'une fonction impaire bijective est impaire.

b) Pourquoi ne peut-on pas parler de la fonction réciproque d'une fonction paire ?

**Exercice 2.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$ . Montrer que  $f$  est continue, bijective de  $\mathbb{R}$  dans  $f(\mathbb{R})$  et déterminer sa réciproque  $f^{-1}$  (on précisera bien l'ensemble de définition de  $f^{-1}$ ).

**Exercice 3.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$f(x) = \begin{cases} e^{2x+2} & \text{si } x < -1, \\ 2x + 3 & \text{si } -1 \leq x \leq 0, \\ x^2 + 2x + 3 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

a) Tracer son graphe.

b) Montrer que  $f$  est continue et strictement croissante.

c) Donner les formules définissant sa fonction réciproque  $f^{-1}$  (en précisant bien son ensemble de définition) et tracer le graphe de  $f^{-1}$ .

**Exercice 4.** Montrer que pour tout  $x \in [-1, 1]$  on a

$$\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{et} \quad \sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2}.$$

**Exercice 5.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $\arctan(2x) + \arctan(3x) = \frac{\pi}{4}$ .

**Exercice 6.** Soit  $f(x) = 2xe^{x^2}$ .

a) Montrer que  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et que  $f^{-1}$  est dérivable.

b) Calculer  $f^{-1}(0)$  et  $(f^{-1})'(0)$ .

**Exercice 7.**

a) Montrer que la fonction  $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$  est une bijection. On appelle arccos sa bijection réciproque.

b) Montrer que arccos est continue.

c) Sur quel intervalle arccos est-elle dérivable ?

d) Calculer  $\arccos'(y)$ .

e) Même question avec les fonctions sin et tan restreintes à  $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$  et  $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$  respectivement. On précisera d'abord l'ensemble image de chacune de ces fonctions.

**Exercice 8.** Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \arctan(x) + \arctan(2x)$ .

a) Étudier  $f$  et tracer sa courbe représentative.

b) Montrer que  $f$  est une bijection (de quel ensemble dans quel ensemble ?) et faire l'étude de la fonction réciproque. Tracer sa courbe représentative.

**Exercice 9.** Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \arcsin(4x^3 - 3x)$ .

a) Déterminer le domaine de définition de  $f$ . Étudier la continuité de  $f$ .

b) Étudier sa dérivabilité.

c) Montrer que  $f(x) = -3 \arcsin(x)$  si  $x \in [-1/2, 1/2]$ .

d) Calculer  $f(x)$  pour  $x \in [1/2, 1]$ .

**Exercice 10.** Comparer les fonctions définies par  $f(x) = \arccos(x)$  et  $g(x) = \arcsin(\sqrt{1-x^2})$ .

**Exercice 11.** On définit les fonctions sinh, cosh et tanh pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}.$$

a) Montrer que les fonctions sinh, cosh et tanh sont dérivables sur  $\mathbb{R}$  et calculer leur dérivée.

b) i) Montrer que la fonction sinh est impaire, strictement croissante et bijective de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On note Argsinh sa bijection réciproque.

ii) Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\text{Argsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ .

iii) Montrer que Argsinh est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et que  $\text{Argsinh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ .

c) i) Montrer que la fonction cosh est paire, strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+$  et bijective de  $\mathbb{R}_+$  dans  $[1, +\infty[$ . On note Argcosh sa bijection réciproque.

ii) Montrer que pour tout  $x \in [1, +\infty[$ ,  $\text{Argcosh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ .

iii) Montrer que Argcosh est dérivable sur  $]1, +\infty[$  et que  $\text{Argcosh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ .

d) i) Montrer que la fonction tanh est impaire, strictement croissante et bijective de  $\mathbb{R}$  dans  $] -1, 1[$ . On note Argtanh sa bijection réciproque.

ii) Montrer que pour tout  $x \in ] -1, 1[$ ,  $\text{Argtanh}(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ .

iii) Montrer que Argtanh est dérivable sur  $] -1, 1[$  et que  $\text{Argtanh}'(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ .



# Chapitre 7 : Dérivées d'ordre supérieur. Développements limités

**Exercice 1.** Déterminer la dérivée  $n$ -ème de la fonction  $f(x) = x^n(1+x)^n$ . En déduire la valeur de  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 2.** Pour une fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$ , on considère la propriété suivante

$$(P) : \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, f(b) - f(a) = (b-a)f' \left( \frac{a+b}{2} \right).$$

- a) Soient  $(A, B, C) \in \mathbb{R}^3$  et  $f$  définie par  $f(x) = Ax^2 + Bx + C$ . Montrer que  $f$  vérifie  $(P)$ .
- b) Soit  $f$  de classe  $C^3$  sur  $\mathbb{R}$  vérifiant  $(P)$ . Écrire la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 3 pour  $f$  entre  $a$  et  $\frac{a+b}{2}$ , puis entre  $b$  et  $\frac{a+b}{2}$ . En déduire que pour tout  $d \in \mathbb{R}$  on a  $f^{(3)}(d) = 0$  puis que  $f$  est un polynôme de degré au plus 2.
- c) Soit  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  vérifiant  $(P)$ . Montrer que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = \frac{f(x+1)-f(x-1)}{2}$ . En déduire que  $f$  est de classe  $C^3$ . Conclure.
- d) Interpréter graphiquement la propriété  $(P)$ .

**Exercice 3.** Soit  $g_1(x)$  la dérivée d'ordre 1 de  $x^2 - 1$ ,  $g_2(x)$  la dérivée d'ordre 2 de  $(x^2 - 1)^2$ , et pour tout entier  $n$  soit  $g_n(x)$  la dérivée d'ordre  $n$  de  $(x^2 - 1)^n$ .

- a) Calculer  $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ .  
Soit  $p \in \mathbb{N}^*$ . On pose, pour  $0 < p \leq n$ ,  $A_n^p = n(n-1) \dots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$ .
- b) Calculer la dérivée d'ordre  $p$  de  $(x-1)^n$  puis celle de  $(x+1)^n$ .
- c) En déduire la dérivée d'ordre  $p$  de  $(x-1)^n$  en 1 et celle de  $(x+1)^n$  en  $-1$ .
- d) Calculer les dérivées d'ordre  $p$  en 1 et  $-1$  de  $(x^2 - 1)^n$ ,  $0 \leq p \leq n$ .
- e) Montrer que si  $n \neq 0$ ,  $g_n(x)$  s'annule au moins  $n$  fois dans  $] -1, 1[$ . (Indication : utiliser d) et le Théorème de Rolle.)

**Exercice 4.** Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions dont le développement limité à l'ordre 1 en 0 est donné par

$$f(x) = 1 + 3x + x\varepsilon_1(x), \quad g(x) = 2 + x + x\varepsilon_2(x).$$

Donner des développements limités à l'ordre 1 en 0 des fonctions suivantes

$$f + 4g, fg, f^2, \frac{1}{f}, \frac{f}{g}.$$

**Exercice 5.** Pour chaque fonction  $f_i$  calculer son développement limité en 0 à l'ordre  $n_i$ .

- |   |            |   |               |
|---|------------|---|---------------|
| a) $f_1(x) = (1+2x) \ln(1+x),$          | $n_1 = 3.$ | g) $f_7(x) = \frac{\cos(x)}{e^x},$            | $n_7 = 3.$    |
| b) $f_2(x) = e^x \ln(1+x),$             | $n_2 = 3.$ | h) $f_8(x) = \ln(1+x \cos(x)),$               | $n_8 = 4.$    |
| c) $f_3(x) = \frac{1+2x}{1-x},$         | $n_3 = 3.$ | i) $f_9(x) = \ln(e^x + e^{-x}),$              | $n_9 = 4.$    |
| d) $f_4(x) = e^x \ln(1+3x)\sqrt{1+2x},$ | $n_4 = 2.$ | j) $f_{10}(x) = \frac{x \sin^2(x)}{1+x+x^2},$ | $n_{10} = 5.$ |
| e) $f_5(x) = \ln(1+x+x^2),$             | $n_5 = 3.$ | k) $f_{11}(x) = \frac{\sin(x)}{\ln(1+x)},$    | $n_{11} = 2.$ |
| f) $f_6(x) = \sin(xe^x),$               | $n_6 = 3.$ |   |               |

**Exercice 6.** Calculer les développements limités suivants :  $f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2}$  en 1 à l'ordre 2,  $g(x) = \sin(\cos(x))$  en 0 à l'ordre 2 et  $h(x) = \cos(x)$  en  $\frac{\pi}{2}$  à l'ordre 6.

**Exercice 7.** Dans un examen récent, on demandait de donner le développement limité de la fonction  $f(x) = e^{\cos(x)}$  à l'ordre 2 en 0. Un étudiant a donné comme réponse

$$f(x) = \frac{5}{2} - x^2 + x^2\varepsilon(x).$$

Expliquer pourquoi le correcteur s'est immédiatement rendu compte que le résultat était faux. Expliquer comment l'étudiant a trouvé ce résultat et pourquoi sa méthode ne marche pas! (Indication : attention au DL de l'exponentielle).

**Exercice 8.** Déterminer, si elles existent, les limites suivantes à l'aide de développements limités.

a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin(x) - x \cos(x) - 2x}{x^5}.$

d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos(x)}{1 - \sqrt{1 - x^2}}.$

b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x) - \arctan(x)}{(1 + x^3)^2 - 1}.$

e)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan(x) - \tan(2x)}{x(1 - \cos(3x))}.$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos(x) - x}{x - \ln(1 + x)}.$

f)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$

**Exercice 9.** Soit  $f$  de classe  $C^2$  sur  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ . Déterminer, si elle existe, la limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + 2h) + f(a) - 2f(a + h)}{h^2}.$$